





1. Do všech tří částí křížovky doplňte správný rodový - (R) nebo druhový - (D) název živočichů z obrázků podle čísel, a získejte tak názvy dalších dvou.





- 1)
- 2)

3. Dokážete určit, které druhy živočichů z křížovek patří v České republice mezi chráněné druhy? Doplňte jejich názvy správně do tabulky.

[illegible]



4. Co mají společného a v čem se liší?

Kuňka ohnivá (obecná)



Kuňka žlutobřichá



Má zaoblený čenich, vystouplé oči, silně bradavičnatou kůži, pestře zbarvené břicho, pestré skvrny na břiše dosahují 35% plochy, prsní skvrny nejsou navzájem propojeny s pažními skvrnami, stehenní skvrny nejsou spojeny. Dorůstá velikosti 4,2 – 5,4 cm.	Má zaoblený čenich, vystouplé oči, silně bradavičnatou kůži, pestře zbarvené břicho, pestré skvrny na břiše přesahují 50% plochy, prsní skvrny jsou navzájem propojeny se skvrnami pažními, stehenní skvrny jsou spojeny. Dorůstá velikosti 4,5 – 5,2 cm.
Páření začíná obvykle po 20. březnu a končí většinou v polovině června, někdy až v červenci.	Páření začíná obvykle po 20. březnu a končí v polovině července.
Samice připevňuje své snůšky (shluky vajíček ve slizovém obalu) na vodní byliny, na kamínky, dřívka ..., nejčastěji do hloubky 4 – 6 cm pod hladinu vody.	Samice přichycuje své snůšky, občas i jednotlivá vajíčka, na vodní byliny, kamínky, dřívka ..., nejčastěji do hloubky 4 – 5 cm pod hladinu vody.
Je aktivní přes den, v létě pak i pozdě do večera.	Je aktivní přes den, v létě pak i pozdě do večera.
Žije samotářsky, jen v době páření vyhledává jedince opačného pohlaví.	Žije v malých i velkých skupinách.
Zimuje na souši v děrách a štěrbinách v silně podmačeném území.	Zimuje na souši, v mokřadech, v děrách a štěrbinách a pod kmeny stromů.
Obývá rybníky, mokřady s tůňkami, má ráda teplé stojaté vody s hloubkou kolem 7 – 40 cm.	Obývá malé rybníky, mokřady s tůňkami, luční tůňky s malým zastíněním.
Je to převážně nížinný druh žáby, obvykle se vyskytuje v oblastech do nadmořské výšky 500 m. V ČR se vyskytuje v jižních, středních a východních Čechách, na Moravě v Poodří, v dolním Pomoraví a v Podyjí.	Je to převážně podhorský až horský druh žáby, obvykle se vyskytuje v oblastech s nadmořskou výškou od 350 do 800 m. V ČR se vyskytuje v jižní části jižních Čech, ve středních a západních Čechách (přibližně od Berouna po Klatovy), na Moravě v oblasti Jeseníků, Beskyd.
Dožívá se 12 – 15 let.	Dožívá se 12 – 15 let.
Oba dva druhy se mohou mezi sebou křížit.	